

ESPÈCES	COMMENTAIRE DESSCRIPTIF	COMESTIBILITÉ				
		TRÈS BON	BON	TOXIQUE	MORTEL	AUCUN INTÉRÊT
<b>FAMILLE BOLETUS</b>						
Boletus cavipes	<i>Bolet à pied creux ; sous mélèzes ;</i>		X			
Boletus pictus	<i>Chapeau moucheté de squames rouges, pied jaune ; sous mélèzes en tourbière ;</i>		X			
Boletus holopus	<i>Bolet tout blanchâtre, endroits très humides ;</i>		X			
Boletus quercina	<i>Chapeau brun mat, squames sur le pied ; sous conifères et feuillus ;</i>		X			
Boletus carpini	<i>Chair grisonnante et noircissante, chapeau craquelé, couleur chamois ;</i>		X			
Boletus subtomentosus	<i>Chapeau velouté ocracé, pied rayé de jaune ; sous feuillus ;</i>		X			
Boletus luteus	<i>Gluant, pores jaunes, anneau blanc et purpurin, chair jaune ; enlever cuticule gluante avant consommation ; sous pins ;</i>		X			
Boletus chrysenteron	<i>Chapeau rosé, pores jaunes, pied à base jaune ;</i>		X			
Boletus americanus	<i>Chapeau brun jaunâtre, pied tacheté de rouge ainsi que sa chair ;</i>		X			
Boletus flavidus	<i>Chapeau jaunâtre, anneau visqueux ; dans les tourbières ;</i>		X			
Boletus grevillei	<i>Chapeau lisse, visqueux, jaune orangé, pores jaunes rougissant au toucher ; anneau jaune pâle ; sous pins ;</i>		X			
Boletus granulatus	<i>Chapeau lisse jaune orangé, pores jaune clair, pied jaunâtre à granules blanchâtres ; sous pins ;</i>		X			

Gomphidius glutinosus	<i>Champignon à lames décurrentes, gluant, pied à base jaune vif ; sous conifères, à l'humidité ;</i>		X			
Hygrophoropsis aurantiaca	<i>Champignon à lames un peu décurrentes jaune orangé , ressemble à la chanterelle ciboire ; sous conifères ;</i>			X		
<b>FAMILLE RUSSULA</b>						
Russula turci	<i>Chapeau couleur améthiste, centre brun, pied blanchâtre ; sent l'iode ; sous pins ;</i>					X
Russula peckii	<i>Chapeau rouge et pied rougeâtre ; piquant ;</i>					X
Russula claroflava	<i>Chapeau jaune vif, pied blanchâtre ; doux ;</i>		X			
<b>FAMILLE LACTARIUS</b>						
Lactarius thionos	<i>Chapeau, pied et lait orange;</i>		X			
Lactarius torminosus	<i>Lait blanc âcre, marge laineuse qui s'enroule ; odeur fruitée ;</i>					X
Lactarius deceptivus	<i>Gros ; lait blanc et amer ; chapeau incurvé ; sous épicéa ;</i>					X
Lactarius zonarius	<i>Chapeau jaunâtre à zones brunâtres ; saveur âcre ;</i>					X
Lactarius piperatus	<i>Tout blanc, lait blanc et très piquant ;</i>					X
Lactarius chrysortheus	<i>Chapeau rougeâtre zoné, lait devenant jaune ; âcre ;</i>					X
Lactarius helvus	<i>Chapeau blond à lait blanc ; séché : sent le biscuit à l'érable ; âcre ; sur mousse en tourbière ;</i>					X
Lactarius chrysorrheus	<i>Chapeau rougeâtre, lait devenant jaune ; âcre ;</i>					X
Lactarius helvus	<i>Chapeau blond à lait blanc ; séché : sent le biscuit à l'érable ; âcre ; sur mousse en tourbière ;</i>					X
<b>FAMILLE HYGROPHORUS</b>						

Hygrophorus cantharellus	<i>Petit lygrophore orangé, lames décurrentes ;</i>					
Pleurotus porrigens	<i>Pleurote blanche ; sur débris ou souches d'arbres morts ;</i>		X			
Cantharella umbonata	<i>Chapeau gris souris et mamelonné, lames à taches vineuses, pied fibreux; sur mousse verte et humide; sous pins ou autres;</i>	X				
Clitocybe clavipes	<i>Chapeau en entonnoir et pied fibreux;</i>					X
Armillaria mellea	<i>Chapeau jaune mielleux, squames; anneau sur le pied; toxique frais; cuisson 2 à 3h en saumure; (jeunes spécimens bons comestibles)</i>			X		
Lepista nuda	<i>Chapeau bleuté à lames violettes; goût très marqué; pousse sur pelouses;</i>		X			
Laccaria tortilis	<i>Chapeau et pied très petits, rosâtres;</i>					X
Catathelasma ventricosa	<i>Armillaire ventruées, gros champignon à lames blanches et chapeau blanc satiné, pied conique enfoui dans le sol;</i>	X				
Lyophyllum connatum	<i>Chapeau et pied blanc satiné, trapu et court; pousse en touffe;</i>					X
Lyophyllum decasters	<i>Chapeau ocre brunâtre; odeur farineuse; pousse en touffe;</i>					X
Melaneuloca brevipes	<i>Brun grisâtre à lames lardacées; pied court; sur pelouses et chemins;</i>					X
Cystoderma amianthinum	<i>Chapeau mamelonné, revêtement poudré jaune, anneau pelucheux; dans la mousse;</i>					X
Marasmius alliaceus	<i>Petit marasme qui pousse sur lit d'aiguilles de conifères; sent et goûte l'ail;</i>		X			
Mycena pura	<i>Fragile, chapeau violacé en forme de cloche; odeur de rave;</i>					X

Clitopilus abortivum						
Entoloma lividum	<i>Gros, couleur beige, pruineux, lames saumonées, sporée rose;</i>			X		
<b>FAMILLE CORTINARIUS</b>						
Cortinarius armilatus	<i>Chapeau rouille, pied avec armille (anneau) rouille;</i>					X
Cortinarius violaceus	<i>Chapeau, lame, pied et chair violets; goût de caveau; sous conifères;</i>					X
Cortinarius alboviolaceus	<i>Chapeau ocre à brun pâle, marge enroulée, lames violacées; pied sculpté de bagues visqueuses; odeur un peu miellée;</i>					X
Cortinarius trivialis	<i>Chapeau ocre à brun pâle, marge enroulée, lames violacées; pied sculpté de bagues visqueuses; odeur un peu miellé;</i>					X
Cortinarius infractus	<i>Chapeau brun foncé zoné, trace de voile sur le pied, chair bleutée; saveur amère;</i>					X
Cortinarius traganus	<i>Chapeau violacé, chair chrome vif, cortine rouille; senteur de poire;</i>					X
Cortinarius splendens	<i>Chapeau jaune chrome vif, lames jaunes, pied à volve marginé jaune ;</i>					X
Cortinarius brunescens	<i>Chapeau mamelonné brun sépia, lames brunes, pied à deux zones annulaires blanchâtres ;</i>				X	
Cortinarius sanguineus	<i>Chapeau, lames et pied rouge sang ; sous conifères ;</i>				X	
Cortinarius semi-sanguineus	<i>Chapeau brunâtre, lames rouges sang, cortine rouge à base orangé ; odeur iodée ;</i>				X	

Rozites caperata	<i>(pholiote ridée) chapeau bossu, ocracé jaune doré, disque enfariné de poudre blanchâtre, pied fibreux avec anneau ; sous conifères, mousse humide ;</i>		X			
Inocybe lacera	<i>Chapeau et pied pelucheux, fibrilleux, brun foncé ; sous conifères et feuillus ;</i>			X		
Pholiota squamosa	<i>Chapeau à squamilles brunes, pied squamilleux avec anneau ; en touffe sur souches de conifères ;</i>			X		
Coprin atramentarius	<i>Gros chapeau gris souris, lames et chair noircissntes vite déliquescentes ; ne pas consommer avec alcool ; sur pelouses ou chemins ;</i>		X			
Coprinus comatus	<i>Chapeau cylindrique blanc pelucheux, pied blanchâtre, creux, avec anneau ; déliquescent ; sur pelouses ou terrains vagues ;</i>	X				
Agaricus bisporus	<i>Chapeau blanchâtre, lames roses, anneau cotonneux ; pâturages après gel ;</i>	X				
Agaricus campestris	<i>Chapeau blanchâtre satiné avec squamules brunes, pied avec anneau, lames roses devenant brun chocolat en vieillissant ; pâturages après gel ;</i>	X				
Lepiota felina	<i>Petit, chapeau blanc moucheté brun sombre, disque brun foncé, pied avec anneau pointillé de noirâtre ; odeur de bois de cèdre ;</i>					X
Lepiota procera	<i>Grand, chapeau mamelonné à disque brun et squames ocracées, pied, anneau épais ;</i>					X

Amanita fulva var. grisea	<i>Chapeau mamelonné fauve strié sur la marge, pied sans anneau, volve membraneuse blanchâtre ; sous feuillus ;</i>		X			
Amanita fulva var. fulva	<i>Chapeau mamelonné fauve strié sur la marge, pied sans anneau, volve membraneuse blanchâtre ; sous feuillus ;</i>		X			
Lycoperdon coloratum	<i>Carpospore, enveloppe mince jaune clair ; intérieur beige ; assez rare ; sur souches ;</i>					X
Lycoperdon piriforme	<i>Carpospore, enveloppe brun pâle, intérieur blanc spongieux ; comestible jeune ; sur souches d'arbres morts, en groupe ; feuillus et conifères ;</i>		X			
Scleroderma citrinum	<i>Carpophore en enveloppe épaisse, coriace, écailles jaune ocracé, intérieur de l'enveloppe brun sale, devenant ardoisé ; ne pas confondre avec vesse-de-loup ;</i>				X	
Cantharellus tubaeformis	<i>Chapeau en cornet étroit, floconneux, brun jaune ocracé ; pied creux ; en troupe sous conifères dans les tourbières ;</i>	X				
Cantharellus lutescens	<i>Chapeau en cornet frisé jaune, pied creux jaune saumoné ; odeur fruitée ; en troupe dans les tourbières ;</i>	X				
Hydnellum caerulum	<i>Chapeau en toupie, rugueux, tomenteux, bleuâtre palissant ; dents décurrentes brunâtres ; sent la farine ; peut tendre coton, lin etc. ; sous conifères ;</i>					X
Hydnellum aurantiacum	<i>Chapeau en toupie, tomenteux, rougeâtre à ocracé ; aiguilles plus pâles ; sous conifères ;</i>					X

Hydnum rufescens	<i>Chapeau étalé, chernu, fauve rouille; aiguilles décurrentes ocre pâle ; pied crème à orangé ; plus petit que h. repandum ; sous conifères dans tourbières ;</i>	X				
Tremiscus helvelloïdes	<i>Chapeau en cornet spatulé, prumineux saumoné; chair molle, translucide; assez rare; sous conifères ;</i>					X
Calocera cornea	<i>Aspect de clavaire, un peu ramifié, jaune ocracé; sur souches ou branches mortes;</i>					X
Peziza badia	<i>Carpophore en coupe, brun foncé; bois calcaires, endroits humides;</i>					X
Aleuria aurantiaca	<i>Coupe orangée, friable ; sur bords de chemin, jusqu'en octobre ;</i>		X			
Otidea onotica	<i>En forme d'oreille de lapin, jaune or; chair fragile; sous feuillus;</i>					X
Leotia lubrica	<i>Chapeau en forme de tête de clou, brun ocracé, pied de même couleur, parfois ponctué de vert ; bois de feuillus et bords de chemins ;</i>					X