

ESPÈCES	COMMENTAIRE DESSCRIPTIF	COMESTIBILITÉ				
		TRÈS BON	BON	TOXIQUE	MORTELS	AUCUN INTÉRÊT
<i>Boletus cyanescens</i>	<i>Bolet, chair devient bleu ciel à la coupe ; bois mêlés ;</i>		X			
<i>Boletus edulis</i>	<i>Cêpe de Bordeaux, riticules (réseau) beige pâle sur le pied ;</i>	X				
<i>Boletus aurantiaca</i>	<i>Bolet orangé, pied riticulé brun ; devient de couleur fumée à la coupe ;</i>	X				
<i>Boletus erythropus</i>	<i>Bolet à pied rouge vif ; devient bleuâtre à noirâtre à la coupe ; assez rare au Saguenay-Lac St-Jean ;</i>					X
<i>Boletus scabrum</i>	<i>Chapeau marron ; pied riticulé ; bleuissant à la cassure ;</i>		X			
<i>Boletus badius</i>	<i>Chapeau marron; pied riticulé; bleuissant à la cassure ;</i>		X			
<i>Boletus piperatus</i>	<i>Petit bolet, chapeau jaunâtre à pores brique ; piquant, sert de condiment ;</i>		X			
<i>Boletus gentilis</i>	<i>Chapeau rose et pores jaune vif ; sous les pins ;</i>		X			
<i>Boletus felleus</i>	<i>Bolet à pores rosés, pied à réseau tomenteux ; très amer ; sous les feuillus ;</i>					
<i>Paxillus involutus</i>	<i>Champignon à lames décurrentes, brun foncé, taches rougeâtres ; lames s'enroulant sur marge ;</i>		X			
<i>Hypomyces lactifluorum</i>	<i>Dermatose, masse orangé, qui couvre les russules ou lactaires ; sur terre sablonneuse des vieux sentiers ;</i>	X				
FAMILLE RUSSULA						
<i>Russula nigrican</i>	<i>Grosse, couleur bistre, chair devient rose à la coupe ;</i>		X			
<i>Russula delica</i>	<i>Chapeau blanc sale, sent le hareng;</i>					X

Russula cyanoxantha	<i>Chapeau verdâtre, lilacin, pied blanc ;</i>		X			
Russula virescens	<i>Chapeau vert crevassé, ressemble à cyanoxantha ;</i>		X			
Russula vesca	<i>Chapeau brun rosé, cuticule en retrait sur la marge "habillé trop court » ;</i>		X			
Russula emetica	<i>Chapeau rouge vif, pied blanc; très piquant ;</i>					X
Russula decolorans	<i>Chapeau orange ocracé, pied blanc; taches grisâtres à la base ;</i>		X			
Russula betulina	<i>Chapeau ocracé, pied blanc ; pousse en association avec les bouleaux ;</i>		X			
Russula integra	<i>Chapeau purpurin, lames jaunes ; sent la noisette ;</i>		X			
Russula mairei	<i>Chapeau rouge vif, centre couleur cerise ; sent le miel ;</i>					X
Russula foetens	<i>Chapeau roussâtre, grosse russule à l'odeur fétide, saveur nauséuse ;</i>					X
Russula laurocerasi	<i>Petite, chapeau roussâtre, sent le laurier-cerisier ; se rapproche de foetens par ses traits ;</i>		X			
FAMILLE LACTARIUS						
Lactarius deliciosus	<i>Lames rouge orangé ; chair devient verdâtre, lait orangé ; sous conifères ;</i>	X				
Lactarius uvidus	<i>Lait violet, saveur âcre ;</i>					X
Lactarius helvus	<i>Lactaire blond (chapeau, pied, lames) ; sent le biscuit à l'érable ; mauvais goût ; pousse dans les tourbières ;</i>					X
Lactarius lignyotus	<i>Chapeau mamelonné brun foncé d'aspect velouté ; sous conifère ;</i>					X
FAMILLE HYGROPHORUS						
Hygrophorus borealis	<i>Tout blanc, lames décurrentes ;</i>					X

Hygrophorus conica	<i>Chapeau rouge vif, pied jaune noircissant ;</i>			X		
Hygrophorus punica	<i>Grande taille, rouge grenadine, chair et pied blancs ;</i>		X			
Hygrophorus pudorinus	<i>Chapeau et pied blancs teintés de pêche ; odeur de thuya ;</i>					X
Laccaria laccata var. proxima	<i>Plus gros que celui du printemps ; chapeau à marge striée, rosâtre ;</i>					X
Tricholomopsis rutilans	<i>Ressemble à un tricholome, chapeau jaune moucheté de fines écailles rouge ; saveur amarescentes ;</i>					X
Tricholomopsis saponaceum	<i>Chapeau gris pâle , visqueux, gros, sent le savon ;</i>					X
Tricholomopsis virgatum	<i>Chapeau vergeté de blanc et grisâtre ; saveur amère et poivrée ;</i>			X ?		
Tricholomopsis columbetta	<i>Chapeau et pied blancs, soyeux, satinés ; ressemble à l'amanite vireuse ;</i>					
Tricholomopsis sejunctum	<i>Chapeau fibrilleux jaunâtre à vert ; très amer ;</i>					X
Tricholomopsis terreum	<i>Chapeau vergeté noirâtre, ardoisé ; odeur herbacée ;</i>					X
Catathelasma armillaria ou ventricosa	<i>Blanc, énorme, satiné, pied conique ; peut peser jusqu'à 5 lbs (2kg) ; sur lit d'aiguilles de sapins ou pins ;</i>	X				
Marasmius oreades	<i>Petit, beige, pied très coriace ; en ronds de sorcière sur pelouses ; déshydraté, goûte les noix ; ne pas confondre avec agrocybe ;</i>	X				
Collybia confluens	<i>En forme de cloche, à lames très serrées ; odeur de curcumin ; pousse en touffe ;</i>					X
Collybia dryophila	<i>Rougeâtre, en forme de cloche; pousse en touffe sur debris végétaux et souches d'arbres ;</i>					X

Collybia maculta	<i>Tout blanc, pied fibrilleux ; saveur amère ;</i>					X
Mycena inclinata	<i>Champignon fragile, à lames ; marge striée, brun jaune ; odeur de bougie ; pousse en touffe sur souches ;</i>					X
Clitopilus prumulus	<i>Champignon charnu, chapeau blanchâtre à lames décurrentes rose vif ; forte odeur et saveur de farine ;</i>					X
Amanita virosa	<i>Tout blanc avec anneau blanc et volve blanche ; en forêt ; MORTEL</i>				X	
Amanita muscaria var. formosa	<i>Chapeau jaune à verrues blanches, pied à anneau et volve bourletée ; en forêt ;</i>			X		
Amanita rubescens	<i>Chapeau rougeâtre à verrues blanchâtre, anneau ;</i>			X		
Amanita flavoconia	<i>Chapeau jaune orangé à verrues orangées et anneau ; pousse isolé ;</i>					X
Phallus impudicus	<i>Verge élancée, blanchâtre, verdâtre, volve verdâtre ; puant, attire les mouches qui en font la multiplication ;</i>					X
Mutinus caninus	<i>Rappelle impudicus, mais l'extrémité est rougeâtre sous un gléba verdâtre ;</i>					X
Cyathus striatus	<i>En forme de nid;</i>					X
Lycoperdon perlatum	<i>Globuleux, blanc parsemé de perles ; avec l'âge, l'intérieur devient jaune brun ;</i>		X			
Bovista gigantea	<i>Vesse-de-loup géante; dans les pâturages et sur les pelouses ;</i>		X			
Cantharellus cibarius	<i>Chapeau en forme d'entonnoir avec plis décurrent sur pied jaune d'œuf ; bois d'érables et feuillus ;</i>	X				
Cratellus cornucopioides	<i>Chapeau en forme d'entonnoir foncé (noir) ; bordures de chemins ;</i>		X			

Gomphus floccosus	<i>Chapeau en forme d'entonnoir écaillé, orangé ; pousse sous les feuillus , assez vieux boisés ;</i>		X			
Gomphus clavatus	<i>Chapeau en forme de cône tronqué, extérieur ridé violacé ; bois de conifères ;</i>		X			
Clavulinopsis fusiformis	<i>Clavule haute, jaune vif; purgatif;</i>					X
Clavariadelphus truncates	<i>Clavule en forme de massue, ridée, jaune doré; sous feuillus et conifères ; purgatif ;</i>					X
Ramaria aurea	<i>Ramifications formant une touffe jaune or ; pied blanc ; sous feuillus ; purgatif ;</i>					X
Clavulina cinerea	<i>Touffe, clavule ramifiée grise, pied blanc ; lit d'aiguilles de conifères ;</i>					X
Sarcodon imbricatum	<i>Aiguilles ou épines sous le chapeau, imbriqué d'écailles brun à roussâtre ; aiguillons décurrents blanchâtres ; comestibles très jeune ; sent la farine ;</i>		X			
Hydnum repandum	<i>Charnu, jaune orangé ; aiguillons décurrents crème à ocracé ; sous feuillus ou conifères ;</i>		X			
Hericiium clathroïdes	<i>Hydne blanc, nombreux rameaux fragiles à face inférieure couverte d'aiguillons pendants ;</i>					X
Polyporus sulfureus (laetiporus)	<i>Polypore imbriqué, orangé à jaune soufre ; sur troncs de feuillus ;</i>					X
Piptoporus betulinus	<i>Polypore du bouleau ; charnu, blanchâtre à café ; sur bouleaux ;</i>					X
Ganoderma lucidum	<i>Polypore luisant ; croûte vernissée de rouge grenat ; sur troncs de feuillus ; symbole de fertilité ;</i>					X

Fome fomentarius	<i>Polypore “amadou”; forme de sabot de cheval, brun grisonnant; coriace; sur arbres morts ou blessures d’arbres vivants ; sert d’allume-feu ;</i>					X
Daedalea confrosa	<i>Polypore, forme de galette coriace ; dessous, pores irréguliers en forme de dédale ;</i>					X
Cordicep capitata	<i>Forme de massue, orangé ; parasite des insectes ou larves et des elaphomyces ;</i>			X		
Elaphomyces granulatus	<i>Truffes</i>			X		