

ESPÈCES	COMMENTAIRE DESSCRIPTIF	COMESTIBILITÉ				
		TRÈS BON	BON	TOXIQUE	MORTEL	AUCUN INTÉRÊT
Pleurotus ostreatus (pleurote en forme d'huître)	<i>Chapeau en forme de coquille blanchâtre. Sur souches d'arbres, de feuillus.</i>		X			
Resupinatus applicatus	<i>Petite cloche grisâtre fixée sur les branches</i>					X
Panellus stipticus	<i>Chapeau en forme d'huître, soudé aux branches. Saveur âcre</i>					X
Laccaria laccata	<i>Chapeau à marge striée, roux rosé ; prend plus forme</i>					X
Melanoleuca melaneuca	<i>Champignon brun à lames, difficile à identifier</i>					X
Melanoleuca brevipes	<i>Champignon brun à lames, à pied court</i>					X
Collybia fusipes	<i>Marge enroulée, chapeau rouille et revêtement mat. Pied fusiforme; sur souche d'arbre</i>					X
Collybia confluens	<i>Pousse en touffe; pied velouté beige comme le chapeau</i>					X
Pluteus cervinus	<i>Gros champignon, chapeau couleur de cerf, odeur de rave;</i>					X
Crepidotus variabilis	<i>Chapeau latéral; pousse sur brindilles de branches de feuillus;</i>					X
Crepidotus mollis	<i>Chapeau latéral; pousse sur brindilles de branches de feuillus</i>					X
Hypholoma fasciculare	<i>Pousse en talle sur souches de feuillus morts;</i>			X		
Coprinus micaceus	<i>En forme de cloche, chapeau poudré brillant au soleil; chair noircissante;</i>					X
Lydoperdon pyriforme	<i>Boule brun pâle sur débris; du printemps à l'automne.</i>		X			
Clavaria fragilis	<i>En forme de ramifications; blanc, purgatif</i>					X
Telephora terrestris	<i>Forme de fleur brune, écailleuse, à collerettes minces et coriaces; sur sol ou débris.</i>					X

Schizophyllum commune	<i>Forme d'éventail blanchâtre, velouté; sur souches ou buches de vieux bouleaux ou autres;</i>						X
FAMILLE POLYPORES							
Trametes versicolor	<i>Chapeau imbriqué avec zones de diverses couleurs chatoyantes; sur bois mort</i>						X
Trichaptum abietinum	<i>Chapeau imbriqué brun à marge purpurin; sur bois mort et vivant;</i>						X
Pycnoporus cinnabarinus	<i>Tramète rouge brique à orangé; sur bois, spécialement merisier et cerisier;</i>						X
Lenzites betulina	<i>Chapeau zoné de brun pâle; sur bouleaux;</i>						X
Coltricia perennis	<i>Chapeau circulaire, velouté de brun rouille à ocracé; coriace; sur le sol, souvent dans des endroits brûlés;</i>			X			
Auricularia auricula	<i>Oreille de Judas, en forme d'oreille, gélatineux; sur branches mortes; ne pas confondre avec l'exidia;</i>		X				
Exidia glandulosa	<i>Pustules gélatineuses brunes; sur branches de feuillus;</i>						X
Calodera cornea	<i>Aspect de clavaire, jaune orange; sur souches pourries;</i>						X
Dacrymyses palmatus	<i>Masse gélatineuse orangée; sur troncs et souches de conifères;</i>						X
Morchella conica	<i>Chapeau en forme d'éponge alvéolée brun noirâtre; sous peupliers baumiers, sol sablonneux; comestible cuit</i>	X					
Morchella esculenta	<i>Chapeau à alvéoles de couleur miel; pousse dans le sable, sous les feuillus; comestible cuit.</i>	X					
Morchella rotunda	<i>Chapeau à alvéoles ocracées; sur sol sablonneux, décombres; comestible cuit seulement;</i>	X					
Verpa conica	<i>Chapeau lisse, comme un dé à coudre, suspendu au sommet d'un pied avec granulations brunâtres;</i>		X				

Verpa bohemica	<i>Chapeau alvéolé, comme un dé à coudre; pied lisse tachant de rouille à la base;</i>		X			
Urnula craterum	<i>Cupule profonde noire (pezize); sur bois brûlé ou fond humide;</i>		X			
Gyromita esculenta	<i>Chapeau en forme de cervelle plissée, brun-rouge; comestible séché seulement;</i>		X			
Gyromitra gigas	<i>Chapeau en forme de cervelle brun miel, pied blanc, en massue; comestible séché seulement</i>		X			
Peziza badia	<i>Pezize; forme d'urne brunâtre; sur sol humide; comestible cuit seulement;</i>					X
Sarcophaera crassa	<i>Coupe de couleur purpurin, violacée; bois calcaire, toxique cru;</i>			X		
Aleuria aurantia	<i>Pezize orangé; sol humide, sentiers en forêt;</i>					X
Scutellina scutellata	<i>Pezize orangé avec petits poils noirs; terre humide, du printemps à l'automne;</i>					X
Bisporella citrina	<i>Cupule jaune vif; très petit; sur bois mort;</i>					X
Nectrina cinnabarina	<i>Petites verrues rouge cinabre vif, sur branches de merisier et autres;</i>					X
Daldinia concentrica	<i>Masse dure, foncée (noire); sur branches ou souches de feuillus;</i>					X